



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

Gasilska zveza Slovenije
Tržaška cesta 221
1000 Ljubljana

Številka: U3440-30/2017/24

Datum: 7. 2. 2017

Zadeva: Aviarna influenza

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 5. 1. 2017 potrdila pojav visoko patogene aviarne influence (HPAI) podtipa H5N8. Pozitivni so bili labodi grbci, najdeni poginjeni v Pragerskem. Po prvi potrditvi so bili pozitivni labodi najdeni še v Mariboru, ob Ptujskem jezeru (občina Markovci) in v okolici (občina Videm), ribnikih pri Rankovcih (občina Tišina), Sečoveljskih solinah (občina Piran) in na Otočcu (občina Novo mesto). Pri treh poginjenih labodih, ki so bili najdeni v reki Krki (občina Brežice), pa so preiskave pokazale prisotnost HPAI podtipa H5N5.

Za nobenega od teh dveh podtipov zaenkrat ni zabeleženih primerov prenosa na ljudi.

Konec prejšnjega meseca je prišlo do večjega pogina labodov na dveh lokacijah: v reki Ledavi med Petišovci in Benico ter v gramoznici Lakoš (oboje v občini Lendava). Tako je bilo od 28. januarja iz reke Ledave pobranih 91 ptic, iz gramoznice Lakoš pa 74. V vzorcih labodov z obeh lokacij je bil ugotovljen podtip H5N8. Na obeh lokacijah so bili Veterinarsko higienski službi ob pobiranju poginulih ptic v veliko pomoč gasilci.

Aviarna influenza je bolezen, za katero je dovzetna vsa perutnina, golobi, tekači ter okrasne in prostoživeče ptice. Ko se pojavi v reji perutnine, povzroča velike gospodarske škode. Največje tveganje za prenos bolezni na perutnino in ptice v ujetništvu predstavlja neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirana krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginjene ptice, izločki prostoživečih ptic, tudi voda, v kateri so se nahajale okužene prostoživeče ptice, ...).

To pomeni, da tudi pomoč pri pobiranju poginjenih vodnih ptic predstavlja tveganje za prenos aviarne influence na perutnino. Zato je pomembno, da tudi gasilci izvajate biovarnostne ukrepe, s katerimi se zmanjša možnost prenosa virusa na domačo perutnino (vašo, sosedovo, itd.):

- obleko, obutev in opremo, ki jo uporabljate pri pobiranju poginjenih ptic iz vode, po vsaki intervenciji dobro operite ter po možnosti razkužite;
- izogibajte se stikom s perutnino ali pticami v ujetništvu.

Informacije v zvezi z aviarno influenco so dostopne na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:


- <http://www.uvhvvr.gov.si/>
- http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/aviarna_influenca/.

Če na vašem območju bolezen pri prostoživečih pticah še ni bila potrjena, to ne pomeni, da ni prisotna. Da bi bila možnost prenosa bolezni s prostoživečih ptic na perutnino čim manjša, vas prosimo, da upoštevate navedena priporočila.

Na koncu bi se radi zahvalili vsem gasilcem za pomoč z željo za dobro sodelovanje tudi v prihodnje.

Lep pozdrav!

Pripravila:
mag. Aleksandra Hari
podsekretarka



dr. Janez Posedi
generalni direktor

